

Albamin

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Nombre del producto:	Albamin
Grupo:	Bioregulador
Composición (p/v):	Nitrógeno (N) orgánico..... 6.9 % Carbono (C) orgánico 32 % Aminoácidos totales 30.51 % Aminoácidos libres 4 %
Formulación:	Líquido soluble
Distribuidor:	Serfi S.A.
Presentaciones del producto:	1 L

Aprobado para uso en Agricultura Orgánica.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **Albamin** es un biorregulador enzimático natural, el cual está compuesto por 18 aminoácidos libres perfectamente balanceados, otorgándoles un efecto sinergista en todas las actividades fisiológicas de la planta.
- **Albamin** contiene 18 aminoácidos que son precursores de las enzimas que intervienen en todos los procesos fisiológicos de la planta, tales como: germinación, trasplante, brotamiento, floración, cuajado y llenado de frutos.
- **Albamin** al ser de origen natural, le permite integrarse rápidamente dentro de los procesos fisiológicos de la planta. Estos efectos incrementan la floración, intensifican la coloración del fruto, anticipan la madurez y mejoran la conservación de los frutos.
- **Albamin** se recomienda aplicar en todo periodo de estrés, heladas, calor, falta de agua, ataque de plagas, virosis, fitotoxicidad, granizo, asfixia radicular y sequía.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Ingestión:** Lavar la boca con abundante agua y beber copiosamente. Avisar de inmediato al médico.
- **Inhalación:** Retirar a la persona del área contaminada y llevarla a un lugar ventilado.
- **Contacto dermal:** Retirar la ropa y calzado contaminado. Lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón durante 15 minutos como mínimo.
- **Contacto ocular:** En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua limpia durante 10-15 minutos. Si la irritación persiste consiga atención médica.
- **Tratamiento médico:** Sintomático.
- **Teléfonos de emergencia:** **SAMU: 106**
SERFI: 710-4068

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN

Albamin se usa por vía foliar, inyectado por el sistema de riego (goteo, etc.) o en aplicaciones dirigidas al cuello de planta en caso de estrés o ataques fungosos.

Albamin puede ser aplicado por el sistema de riego tecnificado.

Albamin se usa en dosis de 0.8 a 1 litro por hectárea y por aplicación. Se recomienda 3 a 5 aplicaciones durante el ciclo de cultivo y durante todo periodo de estrés.

Albamin se debe aplicar en volúmenes de 200 L en plantas pequeñas y 400 a 800 L en plantas grandes, en aplicaciones foliares.

Albamin debe aplicarse en las horas más frescas del día (muy temprano en la mañana o por la tarde).

SERFI no autoriza ni otorga validez al presente documento para su uso en procesos de selección (Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Simplificada, Subasta Inversa Electrónica, Selección de Consultores Individuales, Comparación de Precios, Contratación Directa y contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias) convocados por entidades o empresas públicas en el marco del Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus normas modificatorias. Asimismo, SERFI no autoriza ni otorga validez al presente documento para su uso en cualquier tipo de trámite administrativo ante cualquier autoridad pública competente a nivel nacional, ni para su uso como medio probatorio en cualquier procedimiento administrativo, proceso judicial o proceso y/o investigación fiscal o policial.

CULTIVO	DOSIS 20 L	DOSIS 200 L	MOMENTO DE APLICACIÓN
Ají, ají jalapeño, páprika, piquillo, tomate, pimienta, pimienta morrón. Ajo, cebolla, nabo, poro. Algodón, palma aceitera, sachá inchi. Apio, espinaca, lechuga. Arroz. Brócoli, col, coliflor. Espárrago, alcachofa. Fresa, melón, pepino, zapallo. Maíz. Papa, camote, yuca.	50 mL	500 mL	De 3 a 5 aplicaciones por campaña. 1. Aplicar entre los 7 a 10 días después de trasplante. 2. Aplicar durante el desarrollo vegetativo y floración del cultivo. 3. Repetir cada 20 días en situaciones de estrés del cultivo.
Leguminosas: arveja, caupi, frijol, habas, holantao, pallar, vainita.	50 mL	500 mL	De 3 a 5 aplicaciones, cada 20 días, a partir de que la planta tenga 4 a 6 hojas.
Frutales siempre verdes: Aguaymanto, arándano, cacao, café, dátil, granadilla, limón, lúcumá, mandarina, mango, maracuyá, naranja, olivo, palto, papayo, pepino dulce, plátano, tangelo, tara, toronja, tuna y demás frutales.	50 mL	500 mL	De 3 a 5 aplicaciones por campaña. 1. Aplicar posterior a la poda y durante el desarrollo vegetativo. 2. Aplicar durante la etapa de inicio de floración y floración plena. 3. Repetir cada 20 días en situaciones de estrés del cultivo.
Frutales caducifolios: Cereza, durazno, granado, higo, manzano, pecano, peral, vid, y demás frutales.	50 mL	500 mL	De 3 a 5 aplicaciones por campaña. 1. Aplicar posterior a la poda y durante el desarrollo vegetativo. 2. Aplicar durante la etapa de inicio de floración y floración plena. 3. Repetir cada 20 días en situaciones de estrés del cultivo.

Tratamiento en Estado de Estrés

CULTIVO	DOSIS 20 L	DOSIS 200 L	MOMENTO DE APLICACIÓN	OBSERVACIÓN
Todos	50 mL	500 mL	Heladas, sequías, calor, asfixia radicular, daños por el viento, después del trasplante, ataque de plagas, virosis, fitotoxicidad.	Aplicando 3 a 5 veces después del daño en mezcla con Oligomix-Co en 100 g/200 L ó 10 g/20 L o 10g/20 L.

Dosis por volumen de agua aplicada:

TIPO DE CULTIVO	Dosis/ha	Volumen Aplicación (L/ha)	Volumen Aplicación (cil/ha)	Dosis/cil.
PLANTAS PEQUEÑAS	500 mL	200	1	500 mL
	750 mL	300	1.5	500 mL
ARBUSTOS	1 L	400	2	500 mL
	1 L	600	3	350 mL
	1.5 L			500 mL
FRUTALES	1.5 L	800	4	350 mL
	2 L			500 mL
	1.5 L	1000	5	300 mL
	2 L			400 mL
	1.5 L	1200	6	250 mL
	2 L			320 mL
	1.5 L	1400	7	200 mL
	2 L			300 mL
	1.5 L	1600	8	190 mL
	2 L			250 mL
	1.5 L	1800	9	170 mL
	2 L			220 mL
	1.5 L	2000	10	150 mL
	2 L			200 mL

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico utilizándolo según las instrucciones.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con cualquier plaguicida de uso común a excepción de compuestos cúpricos, azufrados, aceites minerales y otros de reacción alcalina. **Albamin** se recomienda aplicarlo con Oligomix-Co obteniendo resultados muy satisfactorios en etapas de desarrollo o de estrés.

PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO Y DESECHO DE ENVASES VACÍOS

- Almacenar el producto a la temperatura comprendida entre 10 °C y 35°C, en un lugar seco, fresco y bien ventilado; dentro de su envase original bien cerrado, alejado de fuentes de calor, de la radiación solar directa y fuera del alcance de los niños y de animales.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar el triple lavado del presente envase.

SERFI no autoriza ni otorga validez al presente documento para su uso en procesos de selección (Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Simplificada, Subasta Inversa Electrónica, Selección de Consultores Individuales, Comparación de Precios, Contratación Directa y contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias) convocados por entidades o empresas públicas en el marco del Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus normas modificatorias. Asimismo, SERFI no autoriza ni otorga validez al presente documento para su uso en cualquier tipo de trámite administrativo ante cualquier autoridad pública competente a nivel nacional, ni para su uso como medio probatorio en cualquier procedimiento administrativo, proceso judicial o proceso y/o investigación fiscal o policial.



RESPONSABILIDAD CIVIL

El distribuidor garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las indicadas en etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas; siendo el usuario responsable de los posibles daños causados como resultado de la omisión total o parcial de las instrucciones dadas.