

Kalex

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Nombre del producto:	Kalex
Grupo:	Fertilizante foliar NPK 0-42-28
Composición (p/v):	Nitrógeno (N) total ureico..... 0.5 % Anhidrido fosfórico (P_2O_5) soluble en agua 42 % Óxido de potasio (K_2O) soluble en agua 28 %
Formulación:	Líquido soluble
Distribuidor:	Serfi S.A.
Presentaciones del producto:	1L, 200L

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Kalex es un inductor de defensa que contribuye a la resistencia de la planta al fortalecer su metabolismo energético, mejorar la estructura celular y favorecer la producción de compuestos defensivos.

Kalex es fácilmente absorbido por vía foliar y radicular.

Kalex aplicado en las primeras etapas de desarrollo de los cultivos estimula la formación de raíces, la floración y desarrollo de frutos (calidad, color, grados brix).

PRIMEROS AUXILIOS

- **Ingestión:** Lavar la boca con abundante agua y beber copiosamente. Avisar de inmediato al médico.
- **Inhalación:** Retirar a la persona del área contaminada y llevarla a un lugar ventilado.
- **Contacto dermal:** Retirar la ropa y calzado contaminado. Lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón durante 15 minutos como mínimo.
- **Contacto ocular:** En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua limpia durante 10-15 minutos. Si la irritación persiste consiga atención médica.
- **Tratamiento médico:** Sintomático.

Teléfonos de emergencia: SAMU: 106

SERFI: 710-4068

RECOMENDACIONES DE USO

Kalex puede ser aplicado por vía foliar, en drench, fertirriego y de manera tópica al tronco.

Dosis:

1. **Foliar:** 400 – 600 mL por cil 200 L (2 – 3 L/ha)
2. **Radicular:**

DOSIS DE KALEX POR ÁRBOL*	FRUTAL
12 – 15 mL/árbol	Copa pequeña
15 – 20 mL/árbol	Copa mediana
20 – 25 mL/árbol	Copa desarrollada

*diluido en 5 L de agua

3. **Riego tecnificado:** 3 – 4 L/ha, dependiendo del tamaño del cultivo.
4. **Tópica al tronco:** Pintar las zonas afectadas con una solución de 400 mL/L de agua. Repetir 3 a 4 veces al año.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN
Ají jalapeño, páprika, pimienta, piquillo, pimienta morrón, rocoto y demás ajíes. Alcachofa, berenjena, fresa, marigold, tomate, melón, pepinillo, zapallo	1 ^{era} aplicación 5 días después del trasplante. Repetir 3 veces cada 15 - 20 días.
Ajo, betarraga, cebolla, poro, nabo, zanahoria.	1 ^{era} aplicación a partir de la tercera hoja o 7 días después del trasplante. Repetir 2 veces cada 10 días.
Algodón	Aplicar después del deshoje y repetir a los 15 días
Arroz	En almacigo aplicar 3 días antes de la saca. Después aplicar en la etapa de macollamiento y punto de algodón.
Brócoli, Col, Coliflor, Col de Bruselas	1 ^{era} aplicación a la tercera hoja o 7 días después del trasplante. Repetir 2 veces cada 10 días.
Camote, papa, yuca.	1 ^{era} aplicación 20 días después de la siembra de los esquejes o cuando se expande totalmente el brote.
Espárrago	1 ^{era} aplicación después del brotamiento (cambio de color de los filocladios). Repetir aplicaciones cada 15 días.
Leguminosas: Arveja, caupi, frijol, garbanzo, habas, holantao, pallar, vainita.	1 ^{era} aplicación cuando la planta presente 4 folíolos. Repetir 2 veces cada 15 a 20 días.
Maíz	1 ^{era} aplicación a partir de las 3 hojas. Repetir a los 15 días.
Quinoa	1 ^{era} Al inicio del desarrollo vegetativo. 2 ^{da} Repetir a los 20 días. 3 ^{era} Al inicio de la floración.
Frutales caducifolios: Cereza, ciruelo, granado, higo, manzano, melocotón, peral, pecano y demás frutales.	Aplicación al inicio de la floración.
Frutales siempre verdes: Arándano, aguaymanto, cacao, café, dátil, granadilla, limón, lúcuma, mandarina, maracuyá, mango, naranja, olivo, palto, papayo, tangelo, toronja, tara, pepino dulce, tuna y demás frutales.	Aplicación en post cosecha.
Plátano	Aplicación antes de la floración.
Vid	Aplicación al inicio de la floración.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico usado a la dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO Y DESECHO DE ENVASES VACÍOS

- Almacenar el producto a la temperatura comprendida entre 10 °C y 35 °C, en un lugar seco, fresco y bien ventilado; dentro de su envase original bien cerrado, alejado de fuentes de calor, de la radiación solar directa.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El distribuidor garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las indicadas en etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas; siendo el usuario responsable de los posibles daños causados como resultado de la omisión total o parcial de las instrucciones dadas.