

Quimifol®

KK 300

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Nombre del producto:	Quimifol® KK 300
Grupo:	Fertilizante foliar K 0-0-30
Composición (p/v):	Óxido de Potasio (K_2O) soluble en agua30.0 %
Formulación:	Líquido soluble
Distribuidor:	Serfi S.A.
Presentaciones del producto:	1L, 5L, 20L

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **Quimifol® KK 300** es un fertilizante líquido de uso general con un alto contenido de potasio. Este elemento está ligado totalmente a una molécula orgánica (acetato de potasio) y es por tanto completamente asimilable por todas las partes de la planta.
- **Quimifol® KK 300** es totalmente bioasimilable por la planta.
- **Quimifol® KK 300** incrementa la traslocación de los sólidos solubles en el floema, por lo que acelera el crecimiento y desarrollo de los frutos, tubérculos, bulbos y cualquier otro órgano de reserva cosechable.
- **Quimifol® KK 300** incrementa tamaño y peso de frutos así como mejora la calidad de los mismos.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Ingestión:** Lavar la boca con abundante agua y beber copiosamente. Avisar de inmediato al médico.
- **Inhalación:** Retirar a la persona del área contaminada y llevarla a un lugar ventilado.
- **Contacto dermal:** Retirar la ropa y calzado contaminado. Lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón durante 15 minutos como mínimo.
- **Contacto ocular:** En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua limpia durante 10-15 minutos. Si la irritación persiste consiga atención médica.
- **Tratamiento médico:** Sintomático.

Teléfonos de emergencia: SAMU: 106

SERFI: 710-4068

DOSIS Y MODO DE APLICACIÓN

Dosis: 100 ml/20 L

Dosis: 1 L/200 L

En las etapas finales de formación de frutos, bulbos u otros órganos cosechables se puede elevar la dosis de 2-4 L/200L.

CULTIVOS	MOMENTOS DE APLICACIÓN
Alcachofa Espárrago Cereales: arroz, avena, maíz, quinua, trigo, sorgo. Cultivos Oleaginosos: algodón, palma aceitera, sachá inchi, soya. Cultivos anuales: fresa, melón y zapallo. Hortalizas: Ají, ají jalapeño, brócoli, chile ancho, pimiento, pimiento morrón, páprika, piquillo y demás ajíes. Ajo, apio, berenjena, betarraga, cebolla, col, coliflor, espinaca, lechuga, nabo, pepino, poro, rábano, tomate. Leguminosas: arveja, caupi, frijol, garbanzo, habas, holantao, pallar, vainita. Tubérculos y raíces: camote, oca, olluco, papa, yuca	Intervalo de aplicación cada 15 días, después de la siembra hasta la cosecha.

SERFI no autoriza ni otorga validez al presente documento para su uso en procesos de selección (Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Simplificada, Subasta Inversa Electrónica, Selección de Consultores Individuales, Comparación de Precios, Contratación Directa y contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias) convocados por entidades o empresas públicas en el marco del Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus normas modificatorias. Asimismo, SERFI no autoriza ni otorga validez al presente documento para su uso en cualquier tipo de trámite administrativo ante cualquier autoridad pública competente a nivel nacional, ni para su uso como medio probatorio en cualquier procedimiento administrativo, proceso judicial o proceso y/o investigación fiscal o policial.

CULTIVOS	MOMENTOS DE APLICACIÓN
Frutales siempre verdes: aguaymanto, arándano, cacao, café, chirimoya, dátil, granadilla, guanábana, limón, lúcuma, mandarina, maracuyá, mango, naranja, olivo, palto, papayo, pepino dulce, plátano, tangelo, tara, toronja, tuna y demás frutales. Frutales caducifolios: cereza, ciruelo, granado, higo, manzano, melocotón, pecano, peral, vid	Repetir las aplicaciones cada 15 días después de la siembra hasta la cosecha.
Plantas ornamentales y flores	Aplicaciones cada 20 días hasta la cosecha.

RECOMENDACIONES DE USO

En todos aquellos cultivos que requieren de un elevado aporte de Potasio (tomate, papa, algodón, vid y frutales caducifolios: manzano, durazno, etc.); aplicar sistemáticamente desde la siembra hasta la cosecha con el fin de garantizar una fructificación de excelente calidad en términos de sabor, contenido de azúcar, color y resistencia

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico usado a la dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados.

COMPATIBILIDAD

Evitar mezclas de compuestos con fuerte reacción alcalina, aceite blanco, azufre, polisulfuros y compuestos cúpricos. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO Y DESECHO DE ENVASES VACÍOS

- Almacenar el envase a la temperatura comprendida entre 10 °C y 35 °C, en un lugar seco, fresco y bien ventilado; dentro de su envase original bien cerrado, alejado de fuentes de calor y de la radiación solar directa.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



RESPONSABILIDAD CIVIL

El distribuidor garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las indicadas en etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas; siendo el usuario responsable de los posibles daños causados como resultado de la omisión total o parcial de las instrucciones dadas.